Einführung in das symbolische Rechnen

Übungsblatt 5

Abgabetermin Dienstag, den 22.05.2018 vor der Vorlesung.

1. Sei $G \times M \rightarrow M$ eine Operation der Gruppe G auf der Menge M . Zeigen Sie, dass für $a, b \in M$ durch

$$a \sim b : \iff Ga = Gb$$

eine Äquivalenzrelation gegeben ist.

2. Sei G eine Gruppe. Zwei Untergruppen $U_1, U_2 \subset G$ heißen konjugiert, wenn es ein $g \in G$ gibt mit

$$gU_1g^{-1} := \{gug^{-1} \mid u \in U_1\} = U_2.$$

- (a) Zeigen Sie, dass konjugiert sein eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Untergruppen von G ist.
- (b) Bestimmen Sie die Konjugationsklassen von Untergruppen der Symmetriegruppe des Quadrats. Welche Untergruppen sind Normalteiler?

Hinweis: Sie können die Klassen direkt bestimmen oder den GAP-Befehl `ConjugacyClassesSubgroups` verwenden.

3. Sei G die Symmetriegruppe des Tetraeders

Zeigen Sie, dass

$$G \cong S_4.$$

4. Sei $G = \text{Sym}(O)$ die Symmetriegruppe des Oktaeders O .

(a) Durch Nummerieren der Seiten von O

ist ein Monomorphismus $f_1 : G \rightarrow S_8$ gegeben. Finden Sie Erzeuger von $f_1(G)$ und zeigen Sie Ihre Behauptung mit Hilfe von GAP.

(b) Durch Nummerieren der Ecken von O

ist ein Monomorphismus $f_2 : G \rightarrow S_6$ gegeben. Finden Sie Erzeuger von $f_2(G)$ und zeigen Sie Ihre Behauptung mit Hilfe von GAP.

(c) Interpretieren Sie die in (a) und (b) gefundenen Erzeuger geometrisch.

(d) Bestimmen Sie mit GAP einen Isomorphismus von $f_2(G) \rightarrow f_1(G)$.

Hinweis: Verwenden Sie die GAP Befehle `Group`, `Size` und `IsomorphismGroups`.

5. (4 Zusatzpunkte) Sei G die Symmetriegruppe des Ikosaeders

(a) Berechnen Sie die Gruppenordnung von G .

(b) Bestimmen Sie Erzeuger von G als Untergruppe von S_{12} . Beweisen Sie Ihre Behauptung mit Hilfe von GAP.